

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION

AVERTISSEMENTS AGRICOLES® "AQUITAINE"

GRANDES CULTURES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT PROTECTION DES VÉGÉTAUX Chemin d'Artigues - 33152 CENON CEDEX Tél. 56 86 22 75

Régisseur de Recettes D.R.A.F. AQUITAINE CCP BORDEAUX 6801 - 16 A C.P.P.A.P. N° 1859 AD BULLETIN TECHNIQUE imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles Directeur-Gérant : A. GRAVAUD PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL: 300 F

----- BULLETIN TECHNIQUE N° 10

N° ISSN 0763-7314----

Nouvelle adresse : 51, rue Kiéser - 33077 BORDEAUX CEDEX Tél : 56.0042.03

VENDREDI 7 JUIN 1991

MAIS

* SESAMIE: LE PREMIER VOL SE POURSUIT.

* VERS GRIS: SURVEILLER LES SEMIS DE FIN MAI.

TOURNESOL

* PHOMOPSIS: RISQUES TRES IMPORTANTS.

MAIS

SESAMIE

Le premier vol entre dans une phase de décroissance mais devrait rester à un niveau significatif jusqu'au 15-20 juin.

La protection, en une seule application à pleine dose de produit autorisée ou deux interventions à demi-dose, doit impérativement être mise en oeuvre avant la fin de cette semaine dans les parcelles à risque moyen ou fort (voir bulletin n° 7 du 14 mai).

VERS GRIS

Une recrudescence des captures en piège à phéromone de Scotia segetum est observée autour du 1er juin. Les semis réalisés entre le 25 mai et le 5 juin devront donc faire l'objet d'une surveillance attentive entre leur levée et leur arrivée au stade "5 feuilles". Cela concerne les zones sensibles aux dégâts de vers gris : bordure de Gironde, Vallées de Garonne, Dordogne et Bassin de l'Adour.

TOURNESOL

<u>Situation</u>: de fortes projections viennent d'être observées ces derniers jours suite aux orages sur le piège de Bergerac. Sur les pièges de Nérac et Agen les projections ont été plus faibles.

Préconisation:

- * Parcelles précoces
 - traitées : (suite à notre bulletin n° 9, il est inutile de renouveler une application.
 - non traitées :
 - # variétés tolérantes : il est inutile d'intervenir
 - # variétés traditionnelles : une intervention est conseillée au stade limite de passage.

Utiliser l'un des produits suivants :

Calidan à 4 l PC/ha Peltar F à 7 l PC/ha Punch C (ou CS) à 0,8 l PC/ha Sportak PF à 2 l PC/ha.

* Parcelles tardives (actuellement aux stades 2 à 6 paires de feuilles) : pour les parcelles arrivant au stade 6 paires de feuilles une intervention est justifiée (voir produits plus haut).

(C) - S.R.P.V. AQUITAINE, 1991 - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.

rande andre franktistere anna, regale to the transmission of the flat of the description of the edge of the ed The first of the frequency of the control of the first of the flat of the control of the control of the first of the control of the flat of the control of the control of the flat of the control of the flat of the control of the flat of the control of the control of the control of the control of the flat of the control of the